

Percentual de casos de hanseníase com grau 2 de incapacidade física no momento do diagnóstico entre os casos novos detectados e avaliados no ano. Estados, regiões, Brasil, 2001 a 2019

Estados/Regiões	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007*	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
% Grau 2 Brasil	6,0	5,9	5,6	5,8	5,8	5,7	9,4	7,7	7,2	7,2	7,1	7,6	7,3	6,6	7,5	7,9	8,3	8,5	9,9
% Avaliados	84,7	84,2	84,9	84,8	85,5	86,6	83,0	88,2	89,3	89,4	89,5	88,6	88,1	88,1	87,2	87,3	87,1	86,5	85,6
Região Norte	4,9	5,2	4,9	4,8	4,9	4,3	7,8	6,3	6,3	6,0	6,3	6,3	6,7	6,1	6,7	7,3	8,4	8,7	9,6
Rondônia	3,7	5,0	7,5	5,0	7,3	5,7	7,0	8,1	6,5	5,4	5,1	7,2	6,3	5,7	8,5	5,6	7,2	9,4	8,1
Acre	7,2	4,2	4,8	7,2	3,5	3,2	7,9	6,6	4,7	4,1	1,9	6,5	4,7	8,5	1,6	1,8	7,6	13,5	9,6
Amazonas	8,4	6,5	7,0	7,3	5,5	7,4	8,1	7,7	10,2	8,4	11,2	7,4	11,1	7,8	8,6	11,0	11,0	9,2	11,3
Roraima	7,4	8,6	7,6	6,8	6,0	4,9	13,8	9,2	8,1	12,8	12,0	5,3	4,6	8,4	10,9	6,5	8,6	11,6	12,3
Pará	4,3	5,0	3,7	3,8	4,2	3,4	7,3	5,9	6,0	5,4	6,0	6,0	5,9	6,2	5,7	7,2	7,9	8,3	9,1
Amapá	5,5	4,7	4,8	7,2	6,1	3,3	9,2	7,7	5,5	6,8	8,1	5,5	10,1	4,1	15,7	6,8	6,1	7,8	5,5
Tocantins	3,5	4,5	4,6	5,4	5,2	3,9	8,9	4,6	4,9	6,3	6,1	6,0	6,4	5,2	7,2	7,3	9,5	8,3	10,6
Região Nordeste	5,5	5,3	4,6	5,1	5,2	5,3	8,8	7,3	7,0	6,6	6,9	7,4	6,8	5,7	7,2	6,7	7,9	8,3	8,7
Maranhão	6,8	6,2	5,1	5,3	5,7	5,8	9,6	8,0	7,8	6,8	6,6	8,3	7,0	5,9	7,9	6,9	7,3	7,7	8,1
Piauí	5,1	4,7	3,0	4,9	4,1	5,0	8,1	5,9	5,8	4,7	7,1	6,3	5,1	5,7	5,2	5,6	7,7	7,1	5,3
Ceará	6,7	6,0	6,6	6,6	5,4	6,0	10,7	7,9	8,2	7,8	8,2	7,7	7,7	5,2	9,1	8,1	8,5	10,7	11,8
Rio Grande do Norte	6,3	6,0	8,9	6,3	11,1	6,4	12,0	8,8	10,8	11,2	10,5	6,5	6,0	5,5	9,3	10,4	11,2	9,6	12,7
Paraíba	7,4	6,2	4,9	4,2	4,4	5,3	8,9	9,5	9,2	7,3	10,1	6,8	7,4	6,3	8,9	9,9	10,5	11,4	10,5
Pernambuco	3,5	4,7	3,7	5,8	5,5	5,2	7,2	6,5	5,7	5,8	5,6	5,8	4,3	4,8	4,8	5,2	5,8	7,2	8,7
Alagoas	5,8	3,8	5,8	4,9	8,1	6,3	6,7	12,0	5,0	11,5	5,4	9,8	10,8	4,1	11,0	9,6	9,6	8,5	8,1
Sergipe	5,1	4,9	5,6	6,3	4,9	3,4	6,7	8,3	9,6	8,9	9,5	12,6	8,8	7,0	8,6	7,0	12,8	8,9	10,8
Bahia	4,4	4,2	3,1	3,4	3,9	4,3	8,5	6,4	6,3	5,9	6,3	6,7	8,2	6,4	6,5	5,6	8,6	7,7	7,9
Região Sudeste	8,4	7,8	8,2	8,1	8,1	8,6	12,0	9,9	9,2	9,6	8,6	10,2	9,8	10,5	10,2	13,1	11,9	11,7	14,6
Minas Gerais	10,6	9,7	10,3	8,7	10,8	10,7	13,1	11,0	9,9	12,3	10,0	12,3	10,4	10,9	12,4	13,9	12,0	11,8	15,0
Espírito Santo	6,5	4,8	6,2	5,6	4,1	4,0	5,4	4,8	5,2	5,3	5,0	7,2	5,9	8,1	4,8	8,9	5,8	4,8	7,7
Rio de Janeiro	8,1	7,1	6,5	8,0	5,8	8,1	12,7	8,3	9,7	9,4	9,2	9,5	10,4	10,1	11,2	12,8	13,2	10,8	14,2
São Paulo	7,4	8,1	8,5	8,8	9,7	9,1	14,1	12,8	10,3	9,7	8,9	10,2	10,9	11,3	10,2	14,1	13,5	15,0	17,4
Região Sul	10,3	8,8	8,9	9,6	10,4	8,7	14,6	12,4	12,1	10,9	11,5	10,7	9,4	9,6	9,9	11,5	12,4	14,5	14,3
Paraná	11,5	8,0	8,8	10,1	9,8	8,3	14,3	11,4	12,7	11,4	12,2	9,6	8,0	8,6	8,6	8,7	9,9	12,9	12,7
Santa Catarina	3,9	8,5	10,3	9,5	7,8	10,9	14,5	15,7	11,7	10,6	6,3	12,4	11,5	10,6	11,0	17,9	18,3	12,4	14,8
Rio Grande do Sul	8,3	13,8	8,1	6,9	16,1	9,7	16,5	16,2	8,2	7,1	15,4	16,5	16,1	13,6	17,4	19,5	20,4	24,8	24,7
Região Centro-Oeste	3,9	4,3	4,1	4,6	4,3	4,5	8,0	6,4	5,3	6,4	5,9	6,4	6,5	5,5	6,5	6,3	5,9	6,2	8,7
Mato Grosso do Sul	6,7	5,7	7,6	5,5	5,3	5,6	13,0	7,7	6,3	12,2	7,8	6,1	11,1	6,1	12,4	13,6	9,7	10,4	14,4
Mato Grosso	3,4	3,9	4,0	3,3	3,4	3,5	7,8	4,1	4,3	5,1	5,0	6,1	5,6	5,0	5,4	4,5	5,0	5,4	7,7
Goiás	3,3	4,2	3,2	5,3	4,7	5,0	5,5	7,1	5,3	5,9	5,8	6,5	6,3	6,1	5,9	6,4	6,5	7,3	10,3
Distrito Federal	9,5	7,5	8,6	10,5	10,8	9,0	16,4	17,6	12,6	11,0	13,6	9,5	7,9	5,0	8,0	16,8	13,7	8,0	7,5

Fonte: Sinan/SVS-MS

*2007: Mudança na Variável Avaliação do Grau de Incapacidade Física no Diagnóstico

2019: dados disponíveis em 05/06/2020